

レジメン登録フォーマット

| | | | |
|---|------------|-------|--------------------------------|
| 申請年月日 | 平成30年5月14日 | 使用開始日 | |
| 登録診療科 | 血液内科 | 申請医師 | 上田 周二 |
| レジメン名 | R-FC | | |
| 疾患名 | 慢性リンパ性白血病 | 適応の備考 | 閉鎖式 |
| 適応分類 | | | |
| 1コース日数 | 28 日間 | 総コース数 | コース 催吐性リスク day1:最小度、day2-4:中等度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 リツキシマブ375mg/m ² day1、フルダラ25mg/m ² day2-4、エンドキサン250mg/m ² day2-4 | | | |

| 治療スケジュール・投与日程 (投与日は●) | | | | (day) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 主ルート | 生食500mL | 0.675 本 / m ² | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | リツキシマブ注 | 375 mg / m ² | 下記 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | グラニセトロン注ハック1mg/50mL | 1 本 / body | 30 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | フルダラ注 注射用水100mL | 25 mg / m ² 1 本 / body | 60 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1V(50mg)あたり注射用水2.5mLで溶解し、生食で希釈する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | エンドキサン注 | 250 mg / m ² | 2 時間 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 閉鎖式システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 経口投与 | ボラミン錠2mg | 1-3 錠 / body | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg | 1 錠 / body | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リツキシマブ投与の30分前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】

制吐剤のデキサート注は不要(医師に確認済)。
 フルダラ注は、フルダラ錠(10mg)40mg/m²経口投与への変更も可能。
 リツキシマブ: 前投薬としてボラミン(2)1~3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
 リツキシマブ: 初回はECGモニターをつける。
 リツキシマブ: 投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
 リツキシマブ: 2回目以降はinfusion reaction が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。