レジメン登録フォーマット

申請年月日	2022年2月14日	使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美	化学療法委員会承認年月	年　月
レジメン名	IsaKd(1コース目)【計1回】				
疾患名	多発性骨髄腫	適応の備考			
適応分類	進行・再発				
1コース日数	28 日間	総コース数	1 コース	催吐性リスク	軽度
抗がん剤投与量・投与日	サークリサ10mg/kg day1.8.15.22、カイプロリス20mg/㎡ day1.2、56mg/㎡ day8.915.16				

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分	●							●							●							●						
	点滴静注	デキサート6.6mg	2 本 / body		●							●							●							●						
		デキサート1.65mg	2 本 / body		●							●							●							●						
		ファモチジン注20mg	1 本 / body		●							●							●							●						
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分		●							●							●							●					
	点滴静注	デキサート6.6mg	2 本 / body			●							●							●							●					
		デキサート1.65mg	2 本 / body			●							●							●							●					
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●							●							●							●						
	点滴静注	サークリサ注	10 mg / kg	下記	●							●							●							●						
			/																													
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●							●						
	点滴静注		/																													
			/																													
5	主ルート	5%ブドウ糖液100mL	1 本 / body		●	●																										
	点滴静注	カイプロリス	20 mg / ㎡	30 分	●	●																										
		注射用水100mL	1 本 / body		●	●																										
	1Vあたり10mg製剤は5mL、40mg製剤は20mLの注射用水で溶解後、																															
	5%ブドウ糖液100mLで希釈する																															
6	主ルート	5%ブドウ糖液100mL	1 本 / body									●	●						●	●												
	点滴静注	カイプロリス	56 mg / ㎡	30 分								●	●						●	●												
		注射用水100mL	1 本 / body									●	●						●	●												
	1Vあたり10mg製剤は5mL、40mg製剤は20mLの注射用水で溶解後、																															
	5%ブドウ糖液100mLで希釈する																															
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●						●	●						●	●												
	点滴静注		/																													
			/																													
		レスタミンコーワ錠	5 錠 / body		●							●							●							●						
	経口投与	カロナール錠300mg	3 錠 / body		●							●							●							●						
	サークリサ注投与の15～30分前																															

【投与上の注意】
サークリサ：希釈は生食又は5%ブドウ糖液のみ。総液量を250mLに調製。
サークリサ：前投薬としてレスタミン(10)5錠、カロナール(300)3錠を15～30分前までに内服する。
サークリサ：初回の投与速度は、175mg/h×1h、225mg/h×0.5h、275mg/h×0.5h、325mg/h×0.5h、375mg/h×0.5h、残りは400mg/hとする。
サークリサ：2回以降の投与速度は、175mg/h×1h、275mg/h×0.5h、375mg/h×0.5h、残りは400mg/hとする。
※投与速度(mg/h)をポンプの流速(点滴速度)(mL/h)に変換する手順
①点滴バッグ内のサークリサ濃度(mg/mL)の計算(mg/mL)：サークリサ濃度(mg/mL)＝サークリサ投与量(mg)÷250mL
②点滴速度(mL/h)の計算：点滴速度(mL/h)＝投与速度(mg/h)÷サークリサ濃度(mg/mL)
サークリサ：0.2又は0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。
カイプロリス：体表面積が2.2㎡を超える場合は2.2㎡として計算する
day23のデキサート注は、内服でも可