

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2022年2月14日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美
レジメン名	IsaKd(2コース以降)		
疾患名	多発性骨髄腫	適応の備考	
適応分類	進行・再発		
1コース日数	28	日間	総コース数
抗がん剤投与量・投与日		サークリサ10mg/kg day1.15、カイプロリス56mg/m ² day1.2.8.9.15.16	
治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30分	●														●													
	点滴静注	デキサート6.6mg	2 本 / body		●															●												
		デキサート1.65mg	2 本 / body			●															●											
		ファモチジン注20mg	1 本 / body			●															●											
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30分		●						●	●							●						●	●					
	点滴静注	デキサート6.6mg	2 本 / body			●						●	●								●					●	●					
		デキサート1.65mg	2 本 / body				●					●	●									●					●	●				
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●															●												
	点滴静注	サークリサ注	10 mg / kg	下記	●															●												
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●															●												
	点滴静注																															
5	主ルート	5%ブドウ糖液100mL	1 本 / body		●	●						●	●							●	●											
	点滴静注	カイプロリス	56 mg / m ²	30分	●	●						●	●							●	●											
		注射用水100mL	1 本 / body			●	●					●	●								●	●										
		1Vあたり10mg製剤は5mL、40mg製剤は20mLの注射用水で溶解後、5%ブドウ糖液100mLで希釈する																														
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●	●						●	●							●	●											
	点滴静注																															
経口投与	レスタミンコーワ錠	5 錠 / body			●															●												
	カロナール錠300mg	3 錠 / body			●																●											
サークリサ注投与の15~30分前																																

【投与上の注意】

サークリサ:希釈は生食又は5%ブドウ糖液のみ。総液量を250mLに調製。

サークリサ:前投薬としてレスタミン(10)5錠、カロナール(300)3錠を15~30分前までに内服する。

サークリサ:初回の投与速度は、175mg/h×1h、225mg/h×0.5h、275mg/h×0.5h、325mg/h×0.5h、375mg/h×0.5h、残りは400mg/hとする。

サークリサ:2回以降の投与速度は、175mg/h×1h、275mg/h×0.5h、375mg/h×0.5h、残りは400mg/hとする。

※投与速度(mg/h)をポンプの流速(点滴速度)(mL/h)に変換する手順

①点滴バッグ内のサークリサ濃度(mg/mL)の計算(mg/mL):サークリサ濃度(mg/mL)=サークリサ投与量(mg)÷250mL

②点滴速度(mL/h)の計算:点滴速度(mL/h)=投与速度(mg/h)÷サークリサ濃度(mg/mL)

サークリサ:0.2又は0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。

カイプロリス:体表面積が2.2m²を超える場合は2.2m²として計算する

day22、day23のデキサート注は、内服でも可