レジメン登録フォーマット

申請年月日	令和4年3月7日	使用開始日			
登録診療科	泌尿器科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	カルボプラチン＋エトポシド（小細胞がん）				
疾患名	小細胞がん	適応の備考	がん腫：膀胱がん（小細胞がん）		
適応分類	進行・再発				
1コース日数	21　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	day1：高度、day2-3：軽度
抗がん剤投与量・投与日	カルボプラチンAUC5　day1、エトポシド80mg/㎡　day1-3				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　（day）

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	ホスアプレピタント注150mg	1 本 / body	30 分	●																				
			/																						
	（カルボプラチン注投与1時間前）																								
2	主ルート	パロノセトロン注バッグ0.75mg/50mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	デキサート注射液6.6mg/2mL	1 本 / body	30 分	●																				
		デキサート注射液1.65mg/0.5mL	2 本 / body		●																				
	（カルボプラチン注投与30分前）																								
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body			●																			
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分		●																			
			/																						
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body				●	●																	
	点滴静注	デキサート注6.6mg	2 本 / body	30 分			●	●																	
			/																						
5	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	カルボプラチン注	AUC 5 / body	2 時間	●																				
			/																						
6	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●																		
	点滴静注	エトポシド注	80 mg / ㎡	60 分	●	●	●																		
			/																						
	100mgあたり、250mL以上の生食または5%ブドウ糖液に混和する																								
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●																		
	点滴静注		/																						
			/																						

【投与上の注意】
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
エトポシド：DEHPフリー点滴セット使用。