レジメン登録フォーマット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請年月日 | 2022/10/12 | 使用開始日 | | | |
| 登録診療科 | 婦人科 | 申請医師 | 渡辺　正洋 | 化学療法委員会承認年月 | 2022 年　11 月 |
| **レジメン名** | キイトルーダ＋tri-weekly　TC(ホスアプレピタント)(子宮頚がん) | | | | |
| 疾患名 | 子宮頚がん | 適応の備考 | | | |
| 適応分類 | 進行・再発 | | | | |
| 1コース日数 | 21　日間 | 総コース数 | 6　コース | 催吐性リスク | 高度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 | キイトルーダ200mg/body　day1、 パクリタキセル175mg/㎡　day1、カルボプラチン5AUC/body　day1 | | | | |

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 ( 投 与 日 は ● )　　(day)

| 投与順 | ルート・方法 | 薬　剤　名 | 投　与　量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | キイトルーダ | 200 mg / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ホスアプレピタント注150mg | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注6.6mg | 1 本 / body | 15 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート注1.65mg | 2 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ファモチジン注20mg | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ボララミン注5mg | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 主ルート | ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | 30 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 主ルート | 生食500mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | パクリタキセル注 | 175 mg / ㎡ | 3 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | カルボプラチン注 | 5 AUC / body | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デカドロン錠 | 8 mg / body | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経口投与 | 分2　朝昼食後 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デカドロン錠 | 16 mg / body | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経口投与 | 分2　朝昼食後 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】
キイトルーダ：0．2～5μmのインラインフィルターを使用して投与する。
キイトルーダ：希釈後の最終濃度を1～10mg/mLとする。
キイトルーダ：Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間（±30分）に以下の薬剤で前処置を行う。
・レスタミン5錠経口投与（又は同等の抗ヒスタミン薬）
・アセトアミノフェン500～1,000mg経口投与（又は同等の解熱剤）
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
パクリタキセル：前投薬としてデキサート注、ファモチジン20mg、ボララミン注5mg静注が必要。
パクリタキセル：DEHPフリー（フィルターつき）点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。
パクリタキセル：アルコール不耐症がないことを確認する。