

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2022/10/12	使用開始日	
登録診療科	婦人科	申請医師	渡辺 正洋
レジメン名	キイトルーダ(子宮頸がん)維持療法		
疾患名	子宮頸がん	適応の備考	キイトルーダ+tri-weekly TC(ホスアプレピタント)(子宮頸がん)最大6コース後
適応分類	進行・再発		
1コース日数	21 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 最少度
抗がん剤投与量・投与日	キイトルーダ day1		

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)		(day)																							
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	キイトルーダ	200 mg / body	30 分	●																				
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注																								

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例: Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

キイトルーダ: 0. 2~5µmのインラインフィルターを使用して投与する。

キイトルーダ: 希釈後の最終濃度を1~10mg/mLとする。

キイトルーダ: Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下の薬剤で前処置を行う。

- ・ レスタミン5錠経口投与(又は同等の抗ヒスタミン薬)
- ・ アセトアミノフェン500~1,000mg経口投与(又は同等の解熱剤)