

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年9月24日	使用開始日																																		
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	檜原啓之																																	
レジメン名	キイトルーダ(6週毎)(食道扁平上皮がん)																																			
疾患名	食道扁平上皮がん	適応の備考	PD-L1陽性(CPS \geq 10)のがん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮がん																																	
適応分類	進行・再発																																			
1コース日数	42	日間	総コース数																																	
			有効な限り																																	
			コース																																	
			催吐性リスク																																	
			最少度																																	
抗がん剤投与量・投与日 キイトルーダ day1																																				
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)																																				
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	~	42		
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																															
	点滴静注		/																																	
2	主ルート	生食100mL キイトルーダ	1 本 / body 400 mg / body	30 分	●																															
	点滴静注		/		●																															
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																															
	点滴静注		/																																	

【投与上の注意】

- キイトルーダ: 0. 2~5 μ mのインラインフィルターを使用して投与する。
- キイトルーダ: 希釈後の最終濃度を1~10mg/mLとする。
- キイトルーダ: Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下の薬剤で前処置を行う。
 - ・ レスタミン5錠経口投与(又は同等の抗ヒスタミン薬)
 - ・ アセトアミノフェン500~1,000mg経口投与(又は同等の解熱剤)