

レジメン登録フォーマット

| 申請年月日                                | 平成29年4月16日           |                      | 使用開始日         |      |             |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------|-------------|-------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 登録診療科                                | リウマチ科                |                      | 申請医師          | 関口昌弘 | 化学療法委員会承認年月 | 平成 29 年 5 月 |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| レジメン名                                | 少量エンドキサン(難治性リウマチ性疾患) |                      |               |      |             |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| 疾患名                                  | 難治性リウマチ性疾患           |                      | 適応の備考         |      |             |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| 適応分類                                 | 寛解導入療法               |                      |               |      |             |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| 1コース日数                               | 14                   | 日間                   | 総コース数         | 6    | コース         | 催吐性リスク      | 中等度 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| 抗がん剤投与量・投与日    エンドキサン500mg/body day1 |                      |                      |               |      |             |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| 治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)           |                      |                      |               |      |             |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| 投与順                                  | ルート・方法               | 薬剤名                  | 投与量           | 投与時間 | 1           | 2           | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1                                    | 主ルート                 | 生食50mL               | 1 本 / body    | 5 分  | ●           |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
|                                      | 点滴静注                 |                      | /             |      |             |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| 2                                    | 主ルート                 | 生食500mL              | 1 本 / body    |      | ●           |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
|                                      | 点滴静注                 | エンドキサン注<br>閉鎖式システム使用 | 500 mg / body | 2 時間 | ●           |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| 3                                    | 主ルート                 | 生食50mL               | 1 本 / body    | 5 分  | ●           |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
|                                      | 点滴静注                 |                      | /             |      | ●           |             |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |

【投与上の注意】

エンドキサンの用量は500mg~1000mg/m<sup>2</sup>であるが、500mg/bodyへ統一している。  
 エンドキサンの希釈液は生食500mLとしているが、水分制限等のある患者は生食100mLに変更してもよい。