

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日		化学療法委員会承認年月		平成	年	月																						
登録診療科	血液内科	申請医師																												
レジメン名	APL97地固め 第2コース(DNR/ETP/Ara-C)																													
疾患名	急性前骨髄球性白血病	適応の備考																												
適応分類	地固め療法																													
1コース日数	14 日間	総コース数		コース	催吐性リスク	day1-3: 中等度、day4-5: 軽度																								
抗がん剤投与量・投与日	ダウノマイシン50mg/m <sup>2</sup> day1-3、エトポシド100mg/m <sup>2</sup> day1-5、キロサイド140mg/m <sup>2</sup> day1-5																													
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)																													
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	側管	グラニセトロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●	●	●	●	●																					
	点滴静注																													
2	側管	生食100mL	1 本 / body		●	●	●																							
	点滴静注	ダウノマイシン注	50 mg / m <sup>2</sup>	30 分	●	●	●																							
3	側管	生食500mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																					
	点滴静注	エトポシド注	100 mg / m <sup>2</sup>	60 分	●	●	●	●	●																					
100mgあたり、250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和する																														
4	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																					
	精密持続静注	キロサイド注	140 mg / m <sup>2</sup>	24 時間	●	●	●	●	●																					
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分					●																					
	点滴静注	キロサイドフラッシュ用																												

【投与上の注意】

エトポシド: DEHPフリー点滴セット使用。  
 キロサイド: 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。