

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2021.7.20		使用開始日																													
登録診療科	血液内科		申請医師	松永一美		化学療法委員会承認年月	年 月																									
レジメン名	DCd(1コース目)(76歳以上)【計1回】(ダラキューロ皮下注)																															
疾患名	多発性骨髄腫																															
適応分類	進行・再発																															
適応の備考	デキサメタゾン静注、内服いずれも可																															
1コース日数	28		日間	総コース数		1		コース	催吐性リスク		最少度																					
抗がん剤投与量・投与日	ダラキューロ配合皮下注1800mg/body day1.8.15.22、カイプロリス20mg/m ² day1.2、56mg/m ² day8.9.15.16、プレドニン錠:20mg/body day3、デキサメタゾン:20mg/body day22																															
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)																															
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30分	●	●						●								●												
	点滴静注	デキサート6.6mg	3 本 / body			●	●					●								●												
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30分									●							●												
	点滴静注	デキサート6.6mg デキサート1.65mg	1 本 / body 1 本 / body										●							●												
3	なし																															
	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg / body	3~5分	●							●								●						●						
		20mLシリンジで払い出す																														
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●							●								●												
	点滴静注																															
5	主ルート	5%ブドウ糖液100mL	1 本 / body		●	●																										
	点滴静注	カイプロリス 注射用水100mL	20 mg / m ² 1 本 / body	30分	●	●						●	●																			
		1Vあたり10mg製剤は5mL、40mg製剤は20mLの注射用水で溶解後、5%ブドウ糖液100mLで希釈する																														
6	主ルート	5%ブドウ糖液100mL	1 本 / body									●	●							●	●											
	点滴静注	カイプロリス 注射用水100mL	56 mg / m ² 1 本 / body	30分								●	●							●	●											
		1Vあたり10mg製剤は5mL、40mg製剤は20mLの注射用水で溶解後、5%ブドウ糖液100mLで希釈する																														
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●	●						●	●							●	●											
	点滴静注																															
経口投与		プレドニン錠 1日1回	20 mg / body																													
経口投与		デキサメタゾン錠 1日1回	20 mg / body																													
		ダラキューロ配合皮下注投与の1~3時間前																														
経口投与		ポラミン錠2mg ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body 1 錠 / body		●							●								●						●						
		ダラキューロ配合皮下注投与の1~3時間前																														

【投与上の注意】

ダラキューロ配合皮下注: 前投薬としてポラミン(2)1錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
 ダラキューロ配合皮下注: 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、15mLを3~5分かけて投与。(他の部位への投与はデータが得られていない)
 カイプロリス: 体表面積が2.2m²を超える場合は2.2m²として計算する
 デキサメタゾン: 20mg/日内服day22