レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	ALL202-0　地固め第2コース(C2)A(50歳未満)				
疾患名	急性リンパ性白血病	適応の備考			
適応分類	地固め療法				
1コース日数	21　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日	メソトレキセート3000mg/㎡　day1.15、オンコビン1.3mg/㎡　day1.15、ロイケリン散25mg/㎡　day1-21、 【髄注】メソトレキセート15mg/body、デキサメタゾン4mg/body　day1.15				

治療スケジュール　・　投 与 日 程（ 投 与 日 は ● ）　　(day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	グラニセトロン注バッグ1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●														●						
	点滴静注																								
2	主ルート	生食500mL	0.6 本 / body		●														●						
	精密持続静注	メソトレキセート注	3000 mg / ㎡	24 時間	●														●						
			/																						
	50歳以上では1500mg/㎡へ減量する																								
3	側管	生食100mL	1 本 / body		●														●						
	点滴静注	オンコビン注	1.3 mg / ㎡	30 分	●														●						
			/																						
	最大投与量は2mg/body/回を超えないこと																								
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●													●	●					
	点滴静注		/																						
			/																						
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body			●														●					
	点滴静注	アイソボリン点滴静注用	25 mg / body	5 分		●														●					
		ロイコボリン注として50mg/body	/																						
	メソトレキセート投与開始36時間後に投与																								
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body				●	●													●	●			
	点滴静注	アイソボリン点滴静注用	7.5 mg / ㎡	5 分			●	●													●	●			
		ロイコボリン注として15mg/㎡	/				×4	×3													×4	×3			
	Rp5の後、6時間毎に計7回投与する																								
7	なし	生食20mL	1 本 / body		●														●						
	髄注	メソトレキセート注	15 mg / body		●														●						
		デキサート注1.65mg	2 本 / body		●														●						
		ロイケリン散	25 mg / ㎡		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	経口投与		/																						
			/																						
	分1　眠前																								

【投与上の注意】
メソトレキセートの血中濃度を測定する