レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	ALL202-0　地固め第2コース(C2)B				
疾患名	急性リンパ性白血病	適応の備考			
適応分類	地固め療法				
1コース日数	21　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日	メソトレキセート500mg/㎡　day1.15、オンコビン1.3mg/㎡　day1.15、ロイケリン散25mg/㎡　day1-21、 【髄注】メソトレキセート15mg/body、デキサメタゾン4mg/body　day1.15				

治療スケジュール　・　投 与 日 程（ 投 与 日 は ● ）　　(day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL	1	本 / body	30 分	●														●						
	点滴静注																									
2	主ルート	生食500mL	1	本 / body		●														●						
	精密持続静注	メソトレキセート注	100	mg / ㎡	2 時間	●														●						
	最初の2時間で100mg/㎡を投与し、残り22時間で400mg/㎡を投与する																									
3	主ルート	生食500mL	1	本 / body		●														●						
	精密持続静注	メソトレキセート注	400	mg / ㎡	22 時間	●														●						
	最初の2時間で100mg/㎡を投与し、残り22時間で400mg/㎡を投与する																									
4	側管	生食100mL	1	本 / body		●														●						
	点滴静注	オンコビン注	1.3	mg / ㎡	30 分	●														●						
	最大投与量は2mg/body/回を超えないこと																									
5	側管	生食50mL	1	本 / body	5 分	●														●						
	点滴静注																									
6	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分		●														●					
	点滴静注																									
7	主ルート	生食50mL	1	本 / body			●	●	●												●	●	●			
	点滴静注	アイソボリン点滴静注用	7.5	mg / body	5 分		●	●	●												●	●	●			
		ロイコボリン注として15mg/body		/			×1	×4	×3												×1	×4	×3			
	メソトレキセート投与終了後12時間後に投与開始。6時間毎に計8回投与する																									
8	なし	生食20mL	1	本 / body		●														●						
	髄注	メソトレキセート注	15	mg / body		●														●						
		デキサート注1.65mg	2	本 / body		●														●						
	経口投与	ロイケリン散	25	mg / ㎡		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	分1　眠前																									

【投与上の注意】
メソトレキセートの血中濃度を測定する