レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　22 年　3 月
レジメン名	ALL202-U Sancutuary Therapy				
疾患名	急性リンパ性白血病	適応の備考	15歳以上25歳未満の患者を対象とする 第6～9週のConsolidation Therapyに引き続いて第10～11週に行う。		
適応分類	地固め療法				
1コース日数	14　日間	総コース数	1　コース	催吐性リスク	day1.8：中等度、それ以外は最小度
抗がん剤投与量・投与日	メソトレキセート3000mg/㎡　day1.8 【髄注】メソトレキセート12mg/body、キロサイド30mg/body、ソルコーテフ25mg/body　day2.9				

治療スケジュール　・　投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL	1	本 / body	30 分	●							●						
	点滴静注																		
2	主ルート	生食500mL	0.6	本 / body		●							●						
	点滴静注	メソトレキセート注	3000	mg / ㎡	24 時間	●							●						
				/															
	生食200mL抜く																		
3	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分	●							●						
	点滴静注																		
4	主ルート	生食50mL	1	本 / body				●	●						●	●			
	点滴静注	アイソボリン点滴静注用	7.5	mg / ㎡	5 分			●	●						●	●			
		ロイコボリン注として15mg/㎡		/				×4	×2						×4	×2			
	メソトレキセート開始より42時間後から投与を開始する。6時間毎に6回投与する。																		
5	なし	生食20mL	1	本 / body			●							●					
	髄注	メソトレキセート注	12	mg / body			●							●					
		キロサイド注	30	mg / body			●							●					
		ソルコーテフ注100mg	0.25	本 / body			●							●					

【投与上の注意】