

レジメン登録フォーマット

申請年月日	令和6年2月8日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美
レジメン名	APL204寛解導入療法 D群(C群→D群:IDA)		
疾患名	急性前骨髄球性白血病	適応の備考	C群で治療中、APL細胞(芽球+前骨髄球)≥1,000/μLとなった時追加
適応分類	寛解導入療法		ベサノイドはCR後の地固め第1コース開始前日まで連日経口投与、C群から合わせて最長60日まで。
1コース日数	CRまで(最長で60日間)	総コース数	1 コース 催吐性リスク day1:中等度

抗がん剤投与量・投与日 ||イダマイシン12mg/m² day1

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	~	~	60
1	主ルート	グラニセトロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●																						
	点滴静注																										
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																						
	点滴静注	イダマイシン注	12 mg / m ²	30 分	●																						
		注射用水100mL	1 本 / body			●																					
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																						
	点滴静注																										
		イダマイシンフラッシュ用																									
	経口投与	ベサノイドカプセル10mg	45 mg / m ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		分3 医師の指示通り																									
		C群から合わせて最長60日まで																									

【投与上の注意】