

レジメン登録フォーマット

申請年月日	令和6年2月8日	使用開始日		
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美	化学療法委員会承認年月
				年 月
レジメン名	APL204地固め療法 第3コース(IDA/Ara-C)			
疾患名	急性前骨髄球性白血病		適応の備考	
適応分類	地固め療法			
1コース日数	14 日間	総コース数	1	コース
				催吐性リスク
				day1-3:中等度、day4-5:軽度
抗がん剤投与量・投与日 イダマイシン12mg/m ² day1-3、シタラビン(キロサイド)140mg/m ² day1-5				
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)				

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	側管	グラニセトロン注バッグ1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●	●	●	●	●																					
	点滴静注																													
2	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																					
	精密持続静注	シタラビン(キロサイド)注	140 mg / m ²	24 時間	●	●	●	●	●																					
4	側管	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●																							
	点滴静注																													
5	プライミング用																													
	側管	生食100mL	1 本 / body		●	●	●																							
	点滴静注	イダマイシン注	12 mg / m ²	30 分	●	●	●																							
6	側管	生食100mL	1 本 / body		●	●	●																							
	点滴静注	注射用水100mL	1 本 / body		●	●	●																							
3	側管	生食50mL	1 本 / body	5 分						●																				
	点滴静注	シタラビン(キロサイド)フラッシュ用																												

【投与上の注意】

シタラビン(キロサイド): 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトロン点眼、1日3回、両眼、投与前日から投与終了の翌日まで。