

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年1月30日		使用開始日		
登録診療科	血液内科		申請医師	松永 一美	化学療法委員会承認年月
レジメン名	AspaMetDex(70歳以上)				
疾患名	悪性リンパ腫(NK/T)		適応の備考	再発又は難治性	
適応分類					
1コース日数	21	日間	総コース数	3 (responder患者 6コース可)	コース
				催吐性リスク	day1:中等度、day2.4.6.8:最小度
抗がん剤投与量・投与日	メソトレキセート 2000mg/m ² day1、ロイナーゼ6000単位/m ² day2.4.6.8、デキササート注16.5mg(6.6mg×2A、1.65mg×2A) day1-4				

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body	30分	●																				
	点滴静注	ホスアプレピタント注150mg	1 本 / body	30分	●																				
2	主ルート	グラニセトロン注ハッグ1mg/50mL	1 本 / body	30分	●																				
	点滴静注	デキササート注6.6mg デキササート注1.65mg	2 本 / body 2 本 / body		● ●																				
3	主ルート	生食500mL	0.6 本 / body		●																				
	点滴静注	メソトレキセート注	2000 mg / m ²	3時間	●																				
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30分	●	●	●																		
	点滴静注	デキササート注6.6mg デキササート注1.65mg	2 本 / body 2 本 / body		● ●	● ●	● ●																		
5	側管	生食50mL	1 本 / body		●	●	●																		
	点滴静注	アイソボリン点滴静注 ロイコボリン注として15mg/body	7.5 mg / body	5分	●	●	●																		
メソトレキセート投与開始36時間後より、6時間毎計8回投与。																									
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分						●	●														
	点滴静注																								
7	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●			●	●														
	点滴静注	ロイナーゼ注 注射用水100mL	6000 単位 / m ² 1 本 / body	2時間	● ●	● ●	● ●			● ●	● ●														
8	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●	●	●			●	●														
	点滴静注																								

【投与上の注意】

- 70歳以上の患者は、メソトレキセート注2000mg/m²、デキサメタゾン20mg/日×4日間に減量が必要。
- ホスアプレピタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ホスアプレピタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ロイナーゼ注は筋注でも可。
- デキササート注はデカドロン錠20mg(分2朝・昼食後)に変更可