レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年12月28日	使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師	松永　一美	化学療法委員会承認年月	平成　31 年　1 月
レジメン名	AspaMetDex（70歳未満）				
疾患名	悪性リンパ腫（NK/T）	適応の備考	再発又は難治性		
適応分類					
1コース日数	21　日間	総コース数	3 （responder患者　コース 6コース可）	催吐性リスク	day1：中等度、day2.4.6.8：最小度
抗がん剤投与量・投与日	メソトレキセート　3000mg/㎡　day1、ロイナーゼ6000単位/㎡　day2.4.6.8　デキサート注33mg(6.6mg×5A)day1-4				

治療スケジュール　・　投 与 日 程（ 投 与 日 は ● ）　（day）

投与順	ﾙｰﾄ・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	ホスアプレピタント注150mg	1 本 / body	30 分	●																				
			/																						
2	主ルート	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●																				
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5 本 / body		●																				
			/																						
3	主ルート	生食500mL	0.6 本 / body		●																				
	点滴静注	メソトレキセート注	3000 mg / ㎡	3 時間	●																				
			/																						
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分		●	●	●																	
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5 本 / body			●	●	●																	
			/																						
5	側管	生食50mL	1 本 / body			●	●	●																	
	点滴静注	アイソボリン点滴静注	7.5 mg / body	5 分		●	●	●																	
		ロイコボリン注として15mg/body	/			×1	×4	×3																	
	メソトレキセート投与開始36時間後より、6時間毎計8回投与。																								
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分						●		●													
	点滴静注		/																						
			/																						
7	主ルート	生食500mL	1 本 / body			●		●		●		●													
	点滴静注	ロイナーゼ注	6000 単位 / ㎡	2 時間		●		●		●		●													
		注射用水100mL	1 本 / body			●		●		●		●													
8	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●		●		●		●													
	点滴静注		/																						
			/																						

【投与上の注意】
70歳以上の患者は、メソトレキセート注2000mg/㎡、デキサメタゾン20mg/日×4日間に減量が必要。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
・ロイナーゼ注は筋注でも可。
・デキサート注はデカドロン錠40mg（分2朝・昼食後）に変更可