レジメン登録フォーマット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請年月日 | 平成26年5月2日 | 使用開始日 | | | |
| 登録診療科 | 血液内科 | 申請医師 | 上田　周二 | 化学療法委員会承認年月 | 平成　25 年　8 月 |
| **レジメン名** | リツキサン(TTP用) | | | | |
| 疾患名 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 適応の備考 | 対象：難治例または再燃例 | | |
| 適応分類 | | | リツキサンを繰り返し投与する場合は、原則として7日間以上あけて投与すること | | |
| 1コース日数 | 7　日間 | 総コース数 | 8　コース | 催吐性リスク | 最少度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 | リツキサン375mg/㎡　day1 | | | | |

治療スケジュール　・　投 与 日 程 ( 投 与 日 は ● )　　(day)

| 投与順 | ﾙｰﾄ・方法 | 薬　剤　名 | 投　与　量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主ルート | 生食50mL | 1　本 / body | 5　分 | ● | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食500mL | 0.6750　本 / ㎡ | | ● | | | | | | |
| | 点滴静注 | リツキサン注 | 375　mg / ㎡ | 下記 | ● | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | |
| | 10倍に希釈する | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食50mL | 1　本 / body | 5　分 | ● | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | |
| | 経口投与 | ポララミン錠2mg | 1-3　錠 / body | | ● | | | | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg | 1　錠 / body | | ● | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | |
| | リツキサン投与の30分前 | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】
リツキサン：前投薬としてポララミン(2)1～3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
リツキサン：初回はECGモニターをつける。
リツキサン：投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
リツキサン：2回目以降はinfusion reaction　が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。