レジメン登録フォーマット

申請年月日	令和5年12月21日	使用開始日			
登録診療科	リウマチ科	申請医師	関口昌弘	化学療法委員会承認年月	年　月
レジメン名	リツキシマブ(治療抵抗性ループス腎炎)				
疾患名	全身性エリテマトーデス	適応の備考	既存治療で効果不十分なループス腎炎		
適応分類					
1コース日数	7　日間	総コース数	4　コース	催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日	リツキシマブ375mg/㎡　day1				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7
1	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5　分	●						
	点滴静注			/								
				/								
2	主ルート	生食500mL	0.675	本 / ㎡		●						
	点滴静注	リツキシマブ注	375	mg / ㎡	下記	●						
				/								
	10倍に希釈する											
3	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5　分	●						
	点滴静注			/								
				/								
		ポララミン錠2mg	1-3	錠 / body		●						
	経口投与	ジクロフェナクNa錠25mg	1	錠 / body		●						
				/								
	リツキシマブ投与の30分前											

【投与上の注意】
リツキシマブ：前投薬としてポララミン(2)1～3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
リツキシマブ：初回はECGモニターをつける。
リツキシマブ：投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
リツキシマブ：2回目以降はinfusion reaction　が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
原則として副腎皮質ステロイド剤を併用すること。