レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年1月18日	使用開始日			
登録診療科	泌尿器科	申請医師	岸川　英史	化学療法委員会承認年月	平成　31 年　2 月
レジメン名	リツキサン[100mg]（腎移植患者用）				
疾患名	腎移植患者用	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	7　日間	総コース数	2　コース	催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日	リツキサン100mg/body　day1				

治療スケジュール　・　投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●						
	点滴静注		/								
			/								
2	主ルート	生食100mL	0.9 本 / body		●						
	点滴静注	リツキサン注	100 mg / body	下記	●						
		(投与速度は初回は25mg/h×1h、100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。2回目以降はinfusion reaction　が初回になければ100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。)									
		10倍希釈する　生食10mL抜く									
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●						
	点滴静注		/								
			/								
	経口投与	ポララミン錠2mg	1～3 錠 / body		●						
		カロナール錠300mg	2 錠 / body		●						
			/								
		リツキサン投与の30分前									

【投与上の注意】
リツキサン：前投薬としてポララミン（2）1～3錠、カロナール(300)2錠を内服する。
リツキサン：初回はECGモニターをつける。
リツキサン：投与速度は初回は25mg/h×1h、100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。
リツキサン：2回目以降はinfusion reaction　が初回になければ100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。