

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年1月18日	使用開始日			
登録診療科	泌尿器科	申請医師	岸川英史	化学療法委員会承認年月	平成 31 年 2 月
レジメン名	リツキサン [200mg] (腎移植患者用)				
疾患名	腎移植患者用	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	7	日間	総コース数	2	コース 催吐性リスク 最少度
抗がん剤投与量・投与日	リツキサン 200mg/body day1				

治療スケジュール・投与日程 (投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量		投与時間	Day																								
			1	2		3	4	5	6	7																				
1	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分	●																								
	点滴静注			/																										
2	主ルート	生食250mL	0.72	本 / body		●																								
	点滴静注	リツキサン注	200	mg / body	下記	●																								
						(投与速度は初回は25mg/h×1h、100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。2回目以降はinfusion reaction が初回になれば100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。)																								
						10倍希釈する 生食70mL抜く																								
3	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分	●																								
	点滴静注			/																										
		ポララミン錠2mg	1~3	錠 / body		●																								
	経口投与	カロナール錠300mg	2	錠 / body		●																								
						リツキサン投与の30分前																								

【投与上の注意】

リツキサン：前投薬としてポララミン(2)1~3錠、カロナール(300)2錠を内服する。

リツキサン：初回はECGモニターをつける。

リツキサン：投与速度は初回は25mg/h×1h、100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。

リツキサン：2回目以降はinfusion reaction が初回になれば100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。