

レジメン登録フォーマット

申請年月日	令和5年8月28日	使用開始日	
登録診療科	婦人科	申請医師	渡辺 正洋
レジメン名	GC+BEV(卵巣癌・卵管癌・腹膜癌)		
疾患名	卵巣癌・卵管癌・腹膜癌	適応の備考	プラチナ感受性再発
適応分類	進行・再発		
1コース日数	21 日間	総コース数	10 コース
抗がん剤投与量・投与日		催吐性リスク	day1::高度、day8:軽度
抗がん剤投与量・投与日    ゲムシタピン1000mg/m <sup>2</sup> day1,8、カルボプラチン4AUC/body day1、ペバシズマブ 15mg/kg day1			
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	ホスアプレピタント注150mg	1 本 / body	30 分	●																				
2	主ルート	ハロ/セトロン注ハック0.75mg/50mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	デキサート注6.6mg デキサート注1.65mg	1 本 / body 2 本 / body	30 分	● ●																				
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body									●													
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分								●													
4	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●								●												
	点滴静注	ゲムシタピン注	1000 mg / m <sup>2</sup>	30 分	●								●												
5	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	カルボプラチン注	4 AUC / body	60 分	●																				
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●								●												
	点滴静注																								
7	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	ペバシズマブ注	15 mg / kg	30 分	●																				
投与速度は1回目90分、2回目60分、3回目以降30分。																									
8	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●								●												
	点滴静注																								
	経口投与	デカドロン錠	8 mg / body			●																			
	分2朝食後																								
	経口投与	デカドロン錠	16 mg / body				●	●																	
	分2朝食後																								

【投与上の注意】

- ・ホスアプレピタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・ホスアプレピタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・ホスアプレピタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
- ゲムシタピン: 100mLで希釈し、30分で投与。
- ペバシズマブ: 希釈は生食のみ。
- ペバシズマブ: 投与速度は1回目90分、2回目60分、3回目以降30分。