レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020/6/26	使用開始日			
登録診療科	婦人科	申請医師	増原　完治	化学療法委員会承認年月	2020 年　7 月
レジメン名	tri-weekly　TC（アプレピタントカプセル）				
疾患名	子宮がん・卵巣がん	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	21　日間	総コース数	有効な限り　コース	催吐性リスク	高度
抗がん剤投与量・投与日	パクリタキセル175mg/㎡　day1、カルボプラチン5AUC/body　day1				

治療スケジュール　・　投 与 日 程（ 投 与 日 は ● ）　（day）

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1　本 / body		●																				
	点滴静注	デキサート注6.6mg	2　本 / body	15　分	●																				
		デキサート注1.65mg	2　本 / body		●																				
		ファモチジン注20mg	1　本 / body		●																				
		ポララミン注5mg	1　本 / body		●																				
2	主ルート	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg	1　本 / body		●																				
	点滴静注		/	30　分																					
			/																						
3	主ルート	生食500mL	1　本 / body		●																				
	点滴静注	パクリタキセル注	175　mg / ㎡	3　時間	●																				
			/																						
4	主ルート	生食250mL	1　本 / body		●																				
	点滴静注	カルボプラチン注	5　AUC / body	60　分	●																				
			/																						
5	主ルート	生食50mL	1　本 / body	5　分	●																				
	点滴静注		/																						
			/																						
		アプレピタントカプセル	125　mg / body		●																				
	経口投与		/																						
			/																						
	抗がん剤の投与1時間～1時間30分前に服用																								
		アプレピタントカプセル	80　mg / body			●	●																		
	経口投与		/																						
			/																						
	分1午前中に服用																								
			/																						
	経口投与	デカドロン錠	8　mg / body			●	●	●																	
		分2　朝昼食後	/																						

【投与上の注意】

アプレピタントカプセル：各コースにおいて、投与期間は3日間を目安とする。成人で5日間・12歳以上の小児で3日間を超えて投与した際の有効性及び安全性は確立していない。

アプレピタントカプセル：原則としてコルチコステロイド及び5-HT3受容体拮抗型制吐剤と併用して使用すること。

アプレピタントカプセル：抗悪性腫瘍剤の投与1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与すること。

パクリタキセル：前投薬としてデキサート注、ファモチジン20mg、ポララミン注5mg静注が必要。

パクリタキセル：DEHPフリー（フィルターつき）点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。

パクリタキセル：アルコール不耐症がないことを確認する。