

レジメン登録フォーマット

| | | | |
|----------------------|---|-------|---|
| 申請年月日 | 平成30年9月12日 | 使用開始日 | |
| 登録診療科 | 消化器内科・外科 | 申請医師 | 福永 陸 |
| レジメン名 | アービタックス【2回目以降】+FOLFIRI | | |
| 疾患名 | 大腸がん | 適応の備考 | アービタックス+FOLFIRI 2コース目以降の計画登録にはこれを用いる。 アービタックス初回使用の患者の登録には、アービタックス【初回】+FOLFIRIを使用すること。 CVポート |
| 適応分類 | 進行再発 | | |
| 1コース日数 | 14 | 日間 | 総コース数 |
| 抗がん剤投与量・投与日 | アービタックス250mg/m ² day1,8、イリノテカン150mg/m ² day1、5-FU400mg/m ² day1、2400mg/m ² day1 | | |
| 治療スケジュール・投与日程（投与日は●） | (day) | | |

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 主ルート | 生食20mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 15 分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | デキサート注射液6.6mg/2mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | | ポラミン注5mg/1mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | アービタックス | 250 mg / m ² | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 5 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | ホスアプレビタント注150mg | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 主ルート | 抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | ハロ/セトロン注ハッグ0.75mg50mL | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 主ルート | 5%ブドウ糖液500mL | 1 本 / body | 90 分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | イリノテカン | 150 mg / m ² | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Rp.7とRp.8を同時に投与開始する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 側管 | 5%ブドウ糖液250mL | 1 本 / body | 2 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | レボホリナート | 200 mg / m ² | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| Rp.7とRp.8を同時に投与開始する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | 5-FU | 400 mg / m ² | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 点滴速度:全開で | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | 46 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | 5-FU | 2400 mg / m ² | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 携帯型テイスポ-サル注入ポンプ 希釈後の液量を総量140mLとなるよう調製 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

- 穿刺時、生食を使用し、ポートの通過を確認すること
- Rp.7とRp.8を同時に投与開始する
- ホスアプレビタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ホスアプレビタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ホスアプレビタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
- アービタックス:希釈は生食のみ。
- アービタックス:前投薬として、アービタックス投与前に、ポラミン注及びデキサート注が必要。
- アービタックス:投与終了後は、infusion reactionを観察するため、1時間の観察時間が必要であり、単独投与の場合は初回アービタックス投与後生食100mLを1時間かけて滴下する。
- アービタックス:投与速度は1回目のみ2時間、2回目以降1時間。
- アービタックス:投与終了後は、本剤と同じ速度でラインを生食でフラッシュすること。
- アービタックス:初回投与時は、400mg/m²を2時間かけて投与、2回目以降は250mg/m²を1時間かけて投与すること。
- アービタックス+FOLFIRI 2コース目以降の計画登録にはこれを用いる。
- アービタックス初回使用の患者の登録には、アービタックス【初回】+FOLFIRIを使用すること。
- ・day1 デキサート注は、3.3mgでも可