レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年11月12日	使用開始日			
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	岡田一幸	化学療法委員会承認年月	平成　30 年　12 月
レジメン名	トラスツズマブ【2回目以降】(胃がん)				
疾患名	胃がん	適応の備考	シスプラチン投与不可時、S-1またはカペシタビンを併用する 対象:HER2陽性胃がんのみ		
適応分類	進行再発		S-1またはカペシタビン不可時は単剤で投与する		
1コース日数	21　日間	総コース数	有効な限り コース	催吐性リスク	軽度（トラスツズマブ単剤時は最小度）
抗がん剤投与量・投与日	トラスツズマブ6mg/kg day1、　カペシタビン2400mg～4200mg/body 分2もしくはS-1 80mg～120mg/body経口投与 day1夕食後-day15朝食後まで服用				

治療スケジュール　・　投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	側管	生食50mL	1　本 / body	5　分	●																				
	点滴静注		/		●																				
			/																						
	プライミング用		/																						
2	主ルート	生食250mL	1　本 / body	30　分	●																				
	点滴静注	トラスツズマブ	6　mg / kg		●																				
		注射用水100mL	1　本 / body		●																				
	投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																								
3	側管	生食50mL	1　本 / body	5　分	●																				
	点滴静注		/		●																				
			/																						
			/																						
		カペシタビン併用の場合	/																						
	経口投与	カペシタビン	9999　mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
		分2　医師の指示通り	/																						
	(体表面積)　1.36㎡未満　1回1200mg/body																								
	1.36～1.66㎡未満　1回1500mg/body																								
	1.66～1.96㎡未満　1回1800mg/body																								
	1.96㎡以上　1回2100mg/body																								
	day1夕食後-day15朝食後まで服用		/																						
		S-1併用の場合																							
	経口投与	S－1	9999　mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
		分2　朝夕食後																							
	(体表面積)　1.25㎡未満　80mg/day																								
	1.25～1.5㎡未満　100mg/day																								
	1.5㎡以上　120mg/day																								
	day1夕食後-day15朝食後まで服用																								

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ2回目以降の投与患者に使用する

トラスツズマブの投与量は、初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg　day1

トラスツズマブの投与時間は、初回投与90分、2回目以降は30分可

トラスツズマブ:次回以降予定投与が遅れた場合、1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。