

レジメン登録フォーマット

| | | | | | |
|--|----------------|-------|-------|-------------|------------------------------|
| 申請年月日 | | 使用開始日 | | 化学療法委員会承認年月 | 平成 26 年 9 月 |
| 登録診療科 | 消化器内科・外科 | 申請医師 | | | |
| レジメン名 | DCF(ホスアプレビタント) | | | | |
| 疾患名 | 食道がん | 適応の備考 | | | |
| 適応分類 | | | | | |
| 1コース日数 | 21 | 日間 | 総コース数 | 有効な限り | コース 催吐性リスク day1:高度、day2-5:軽度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 ドセタキセル70mg/m ² day1,シスプラチン70mg/m ² day1、5-FU700mg/m ² day1-5 | | | | | |
| 治療スケジュール・投与日程(投与日は●) | | | | | |

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----------------------|--------|------------------|-------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 側管1 | 生食500mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | KCL注キット(1mEq/mL) | 20 mL / body | 1 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 硫酸Mg補正液 | 8 mL / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 側管1 | 生食500mL | 1 本 / body | 1 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | フロセミド注 20mg | 1 A / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 側管1 | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ホスアプレビタント注150mg | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 側管1 | ハロ/セロン注ハック0.75mg | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注6.6mg | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート注1.65mg | 2 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 側管1 | 生食50mL | 1 本 / body | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注6.6mg | 1 本 / body | 30 分 | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 側管1 | 生食50mL | 1 本 / body | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注6.6mg | 2 本 / body | 30 分 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ドセタキセル | 70 mg / m ² | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 主ルート | 生食500mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | シスプラチン | 70 mg / m ² | 2 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチンと同量の生食を抜いて混注する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 主ルート | 生食500mL | 1 本 / body | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | 5-FU | 350 mg / m ² | 12 時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 側管2 | フィジオ140輸液500mL | 1 本 / body | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | | 1 時間 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 主ルート | 生食500mL | 1 本 / body | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | 5-FU | 350 mg / m ² | 12 時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】

- ・ホスアプレビタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・ホスアプレビタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・ホスアプレビタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。

シスプラチン:希釈は生食のみ。
シスプラチン:腎毒性軽減のためhydrationが必要。