

レジメン名	カドサイラ(進行・再発)																								
疾患名	乳がん(HER2陽性進行再発乳がん)	適応の備考																							
適応分類	進行・再発																								
1コース日数	21 日間	総コース数																							
抗がん剤投与量・投与日	カドサイラ注 3.6mg/kg day1	有効な限り																							
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)		コース																							
		催吐性リスク																							
		軽度																							
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	デキサート注	6.6 mg / body	30 分	●																				
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	カドサイラ注 注射用水100mL	3.6 mg / kg	90 分	●																				
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注																								

【投与上の注意】

カドサイラ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

カドサイラ: 溶解後、生食液250mLで希釈する。ブドウ糖液と混合しないこと。

カドサイラ: ポリエーテルスルホン製のインラインフィルターを使用すること。

day1のデキサート注は、3.3mgでもよい。