レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	乳腺外科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	トラスツズマブ3週1回【2回目以降】+ゲムシタビン(乳がん)				
疾患名	乳がん	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	21　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	軽度
抗がん剤投与量・投与日	トラスツズマブ6mg/kg　day1、ゲムシタビン1250mg /㎡　day1.8				

治療スケジュール　・　投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
			/																						
	プライミング用																								
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	トラスツズマブ	6 mg / kg	30 分	●																				
		注射用水100mL	1 本 / body		●																				
	投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																								
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●							●													
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●							●													
			/																						
4	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●							●													
	点滴静注	ゲムシタビン注	1250 mg / ㎡	30 分	●							●													
			/																						
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●													
	点滴静注		/																						
			/																						

【投与上の注意】

・day1.8のデキサート注は、3.3mgでもよい。

このレジメンは、トラスツズマブ2回目以降の投与患者に使用する

トラスツズマブ：初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

トラスツズマブ：初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回。

トラスツズマブ：次回以降予定投与が遅れた場合、1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。