

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	乳腺外科	申請医師	
レジメン名	トラスツズマブ3週1回【初回】+ドセタキセル		
疾患名	乳がん	適応の備考	
適応分類			
1コース日数	21 日間	総コース数	コース 催吐性リスク 軽度
抗がん剤投与量・投与日 トラスツズマブ8mg/kg day1、ドセタキセル75mg/m ² day1			
治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																							
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																																											
	点滴静注		/	/																																												
プライミング用																																																
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																																											
	点滴静注	トラスツズマブ 注射用水100mL	8 mg / kg	90 分	●																																											
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																																																
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●																																											
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●																																											
4	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																																											
	点滴静注	ドセタキセル注	75 mg / m ²	60 分	●																																											
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																																											
	点滴静注		/	/																																												

【投与上の注意】

・day1のデキサート注は、3.3mgでもよい。

このレジメンは、トラスツズマブ初回投与患者に使用する

トラスツズマブ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

トラスツズマブ: 初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回。

トラスツズマブ: 次回以降予定投与が遅れた場合、1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。