

レジメン登録フォーマット

| | | | | |
|-------------|---|-------|--------------------|-----------------|
| 申請年月日 | 令和5年11月28日 | | 使用開始日 | |
| 登録診療科 | 乳腺外科 | 申請医師 | 小西宗治 | 化学療法委員会承認年月 年 月 |
| レジメン名 | フェスゴMA【維持】+weekly/パクリタキセル【2コース目以降】再発 | | | |
| 疾患名 | 乳がん | 適応の備考 | HER2陽性の手術不能又は再発乳がん | |
| 適応分類 | 進行・再発 | | | |
| 1コース日数 | 21 日間 | 総コース数 | 有効な限り | コース 催吐性リスク 軽度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 | フェスゴMA day1 day1、パクリタキセル80mg/m ² day1.8.15 | | | |

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----------------------------|--------|---------------|------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 皮下注射 | フェスゴ配合皮下注【MA】 | 10 mL / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調製後4時間以内に使用 5分以上かけて皮下投与 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注6.6mg | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| | | ファモチジン注20mg | 1 本 / body | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| | 点滴静注 | パクリタキセル注 | 80 mg / m ² | 60 分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| | 点滴静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経口投与 | レスタミンコーワ錠 | 5 錠 / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| パクリタキセル投与の30分前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】

- ・day1.8.15のデキサート注は、3.3mgでもよい。
- ・パクリタキセル：前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。
- ・パクリタキセル：DEHPフリー（フィルターつき）点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。
- ・パクリタキセル：アルコール不耐症がないことを確認する。

このレジメンは、フェスゴ（ベルツズマブ、トラスツズマブ）2回目以降の投与患者に使用する。

フェスゴ皮下注：何らかの理由により予定された投与が遅れた場合には、以下のとおり投与することが望ましい。

- ①前回投与日から6週間未満のとき：維持投与量（フェスゴ MA）を投与する。
- ②前回投与日から6週間以上のときには、改めて初回投与量（フェスゴ IN）を投与し、次回以降は維持投与量（フェスゴ MA）を3週間間隔で投与する。

フェスゴ皮下注：初回投与時は、8分以上かけて大腿部に皮下投与、2回目以降は、5分以上かけて大腿部に皮下投与する。

フェスゴ皮下注：大腿部以外への投与は避ける。

フェスゴ皮下注：注射部位反応が報告されているため、同一箇所へ繰り返し注射することは避け、左右の大腿部に交互に投与する等、前回の注射部位から少なくとも2.5cm離す。

フェスゴ皮下注：皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位（傷、発疹、発赤、硬結等）には注射しないこと。

フェスゴ皮下注：初回投与時は30分の経過観察、2サイクル目以降は、Infusion reaction等の問題がなく、忍容性が良好であれば、観察時間は15分まで短縮可

・パージェタ+トラスツズマブ（IV）からフェスゴに切り替える場合

パージェタ+トラスツズマブ（IV）の直近の投与日から6週間未満のときにはフェスゴMA（維持投与量）を、6週間以上のときにはフェスゴIN（初回投与量）を投与し、その後は3週間毎にMA（維持投与量）を投与する。

・フェスゴからパージェタ+トラスツズマブ（IV）に切り替える場合

フェスゴの直近の投与日から6週間未満のときにはパージェタ、トラスツズマブともに維持投与量（パージェタ：420mg、トラスツズマブ：6mg/kg）を、6週間以上のときにはパージェタ、トラスツズマブともに初回投与量（パージェタ：840mg、トラスツズマブ：8mg/kg）を投与し、その後3週間毎に維持投与量を投与する。